

DE PREVALENTIE VAN AANPASSINGSSTOORNIS BIJ (EX-)KANKERPATIENTEN EN DE EFFECTIVITEIT, KOSTENUTILITEIT EN BUDGET IMPACT VAN OP MAAT GEMAAKTE PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING: STUDIEPROTOCOL VAN DE ADJUST-STUDIE

VAN BEEK FLORIE.¹, WIJNHOFEN LONNEKE.², JANSEN FEMKE.¹, CUSTERS JOSÉ.², AUKEMA ELINE.³, COUPÉ VEERLE.⁴, CUIJPERS PIM.¹, VAN DER LEE MARIJE.⁵, LISSEBERG-WITTE BIRGIT.⁴, WIJNEN BEN.⁶, PRINS JUDITH.², VERDONCK-DE LEEUW IRMA.^{1,7*}



VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Faculty of Behavioural and Movement Sciences

¹VRIJE UNIVERSITEIT, AMSTERDAM ²RADBOUDUMC, NIJMEGEN, ³INGEBORG DOUWES CENTRUM, AMSTERDAM
⁴AMSTERDAM UMC, VRIJE UNIVERSITEIT, AMSTERDAM, ⁵HELEN DOWLING INSTITUUT, UTRECHT ⁶TRIMBOS INSTITUUT, UTRECHT
⁷AMSTERDAM UMC, AMSTERDAM,

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het vaststellen van de prevalentie van aanpassingsstoornis bij kanker en de (kosten)effectiviteit van behandeling

METHODE

Deel 1:

Prevalentie aanpassingsstoornis (AS)

Doelgroep: Patiënten na behandeling voor kanker

Design: Eenmalige vragenlijst gevolgd door een psychologisch interview indien een verhoogd risico op AS (zie Figuur)

Primaire uitkomstmaat: Aanpassingsstoornis (ja/nee)

Deel 2:

Effectiviteit, kostenutiliteit en budget impact van behandeling van AS

Doelgroep: Patiënten met AS na behandeling voor kanker (n=206)

Design: gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT)

1. Interventiegroep*:

Module 1: psycho-educatie (3 sessies)

Module 2: evidence-based interventies (max 6 sessies)

Module 3: evidence-based interventies (max 6 sessies)

*Interventies volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis


2. Wachtlijstcontrolegroep

Primaire uitkomstmaat effectiviteit: psychische distress (HADS)

Secundaire uitkomstmaten: zie tabel.


Vragenlijsten	DEEL 1		DEEL 2	
		Nulmeting	3 maanden na de nulmeting	6 maanden na de nulmeting
HADS Psychische distress	✓	✓	✓	✓
Distress thermometer Psychische distress	✓			
CIS Vermoeidheid	✓			
MAC Aanpassingsvermogen aan kanker		✓	✓	✓
EORTC QLQ-C30 Kwaliteit van leven		✓	✓	✓
IMCQ Zorggebruik		✓	✓	✓
IPCQ Productiviteitsverliezen		✓	✓	✓
EQ-5D-5L Kwaliteit van leven		✓	✓	✓
Sociaal demografische factoren	✓	✓		
Klinische factoren	✓	✓		

Deel 1. Prevalentie aanpassingsstoornis



Patiënten met een aanpassingsstoornis worden uitgenodigd voor deelname aan de RCT

Deel 2. Effectiviteit, kostenutiliteit en budget impact psychologische behandeling



DISCUSSIE / RELEVANTIE

De resultaten van dit ADJUST-project zijn van belang om een advies aan de minister te formuleren over de vergoeding van psychologische behandeling bij kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis.

Wij zijn nog op zoek naar psychologen: voor het afnemen van de diagnostische interviews, en voor de behandelingen.

Wilt u bijdragen aan dit project, neem dan contact op met Florie van Beek: florie.van.beek@vu.nl

